

Examenul de bacalaureat național 2020
Proba E. c)

Matematică $M_{tehnologic}$

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

Model

Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale

- Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1.	$10 - 2 \cdot 3 = 4$ $10 + 2 \cdot 3 = 16 \Rightarrow (10 - 2 \cdot 3)(10 + 2 \cdot 3) = 4 \cdot 16 = 64$	2p 3p
2.	$x_1 + x_2 = 7$ $x_1 x_2 = 10 \Rightarrow 2(x_1 + x_2) - x_1 x_2 = 14 - 10 = 4$	2p 3p
3.	$\log_2(x - 2020) = \log_2 3^2 \Rightarrow x - 2020 = 9$ $x = 2029$, care convine	3p 2p
4.	10% din 200 reprezintă $\frac{10}{100} \cdot 200 = 20$ Prețul după scumpire este $200 + 20 = 220$ de lei	3p 2p
5.	Mijlocul segmentului AB este punctul $M(3, 4)$ $OM = \sqrt{(3-0)^2 + (4-0)^2} = 5$	2p 3p
6.	$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ $\cos 150^\circ = \cos(180^\circ - 30^\circ) = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \sin 60^\circ + \cos 150^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$	2p 3p

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1.a)	$\det A = \begin{vmatrix} -2 & 9 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = (-2) \cdot (-2) - 0 \cdot 9 =$ $= 4 - 0 = 4$	3p 2p
b)	$B(x) \cdot B(-x) = \begin{pmatrix} -x^2 & 6x^2 \\ 0 & -x^2 \end{pmatrix}$, $B(x) \cdot B(-x) + B(x) = \begin{pmatrix} -x^2 + x & 6x^2 - 3x \\ 0 & -x^2 + x \end{pmatrix}$, $x \in \mathbb{R}$ $\begin{pmatrix} -x^2 + x & 6x^2 - 3x \\ 0 & -x^2 + x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 9 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$, de unde obținem $x = -1$	3p 2p
c)	$B(1) = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\det(B(1)) = 1$, $(B(1))^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $X = (B(1))^{-1} \cdot A \Rightarrow X = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$	3p 2p

2.a)	$3 \circ \frac{1}{3} = \frac{9 + \frac{1}{9}}{3 \cdot \frac{1}{3}} =$ $= 9 + \frac{1}{9} = \frac{82}{9}$	3p 2p
b)	$x \circ y - 2 = \frac{x^2 + y^2}{xy} - 2 = \frac{x^2 + y^2 - 2xy}{xy} = \frac{(x - y)^2}{xy}$ Cum $x > 0$, $y > 0$ și $(x - y)^2 \geq 0$, obținem $x \circ y \geq 2$, pentru orice $x, y \in M$	3p 2p
c)	$a^4 + \frac{1}{a^4} - 2 = 0 \Leftrightarrow \left(a^2 - \frac{1}{a^2}\right)^2 = 0, \text{ deci } a^4 = 1$ $a = -1$, care nu convine, $a = 1$, care convine	3p 2p

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1.a)	$f'(x) = (x^3 - 12x + 3)' = 3x^2 - 12 =$ $= 3(x^2 - 4) = 3(x - 2)(x + 2), \quad x \in \mathbb{R}$	3p 2p
b)	$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - (-6)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = f'(3) =$ $= 3(3 - 2)(3 + 2) = 15$	3p 2p
c)	$x \in [-2, 2] \Rightarrow f'(x) \leq 0$, deci f este descrescătoare pe $[-2, 2]$ Cum $f(-2) = 19$ și $f(2) = -13$, obținem $-13 \leq f(x) \leq 19$, pentru orice $x \in [-2, 2]$	2p 3p
2.a)	$\int_{-1}^1 (f(x) - x^5 - 1) dx = \int_{-1}^1 (x^5 + x + 1 - x^5 - 1) dx = \int_{-1}^1 x dx =$ $= \frac{x^2}{2} \Big _{-1}^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$	2p 3p
b)	$\int_0^1 x^{2020} (f(x) - x - 1) dx = \int_0^1 x^{2025} dx = \frac{x^{2026}}{2026} \Big _0^1 =$ $= \frac{1}{2026}$	3p 2p
c)	$g(x) = 1 + \frac{1}{x} \Rightarrow V = \pi \int_1^2 g^2(x) dx = \pi \int_1^2 \left(1 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}\right) dx =$ $= \pi \left(x + 2 \ln x - \frac{1}{x}\right) \Big _1^2 = \pi \left(2 \ln 2 + \frac{3}{2}\right)$	2p 3p