Examenul de bacalaureat naţional 2020
Proba E. c)
Matematică *M_mate-info*

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Test 11

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

- **Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.**
- **Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.**
- **Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.**

SUBIECTUL I **(30 de puncte)**

1.	$\sqrt{7}\left(\sqrt{6}+1\right)-\sqrt{6}\left(\sqrt{7}+1\right)=\sqrt{42}+\sqrt{7}-\sqrt{42}-\sqrt{6}=\sqrt{7}-\sqrt{6}$	**2p**
	Cum $\frac{1}{\sqrt{7}+\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{7}-\sqrt{6}}{\sqrt{7}^2-\sqrt{6}^2}=\sqrt{7}-\sqrt{6}$, obţinem că $\sqrt{7}\left(\sqrt{6}+1\right)-\sqrt{6}\left(\sqrt{7}+1\right)=\frac{1}{\sqrt{7}+\sqrt{6}}$	**3p**
2.	$f\left(x+1\right)-f\left(x\right)=\left(x+1\right)^2+\left(x+1\right)+1-\left(x^2+x+1\right)=$	**2p**
	$=x^2+2x+1+x+1+1-x^2-x-1=2x+2=g\left(x\right)$, pentru orice număr real x	**3p**
3.	$x-1=x^2-2x-1\Rightarrow x^2-3x=0$	**3p**
	$x=0$, care nu convine, sau $x=3$, care convine	**2p**
4.	Numărul de submulţimi ale lui M, cu cel puţin trei elemente, este egal cu $C_5^3+C_5^4+C_5^5=$	**3p**
	$=10+5+1=16$	**2p**
5.	$M\left(-1,2\right)$, unde M este mijlocul segmentului AD, $m_{AB}=1$	**3p**
	Cum MN este paralelă cu AB, ecuaţia dreptei MN este $y-2=x+1$, deci $y=x+3$	**2p**
6.	$4\sin^2 x+4\sin x\cos x+\cos^2 x=2+3\sin^2 x\Leftrightarrow 4\sin x\cos x=2-\left(\sin^2 x+\cos^2 x\right)$	**3p**
	$2\sin 2x=2-1$, deci $\sin 2x=\frac{1}{2}$	**2p**

SUBIECTUL al II-lea **(30 de puncte)**

1.a)	$A\left(0\right)=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&i&0\\-1&0&-1\end{pmatrix}\Rightarrow \det\left(A\left(0\right)\right)=\begin{vmatrix}1&0&2\\0&i&0\\-1&0&-1\end{vmatrix}=$	**2p**
	$=-i+0+0-\left(-2i\right)-0-0=i$	**3p**
b)	$\det\left(A\left(a\right)\right)=\begin{vmatrix}1&a&2\\a&i&a\\-1&a&-1\end{vmatrix}=a^2+i$, pentru orice număr real a	**2p**
	Cum, pentru orice număr real a, $a^2+i\neq 0$, obţinem că $\det\left(A\left(a\right)\right)\neq 0$, deci, pentru orice număr real a, matricea $A\left(a\right)$ este inversabilă	**3p**
c)	$A\left(0\right)\cdot A\left(0\right)=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&i^2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}=-I_3$	**2p**
	$\underbrace{A\left(0\right)\cdot A\left(0\right)\cdot A\left(0\right)\cdot\ldots\cdot A\left(0\right)}_{\text{de 2020 ori } A(0)}=\underbrace{\left(-I_3\right)\cdot\left(-I_3\right)\cdot\left(-I_3\right)\cdot\ldots\cdot\left(-I_3\right)}_{\text{de 1010 ori } (-I_3)}=I_3$	**3p**

2.a)	$x*1=3^{x+1}-3^{x+1}-3^{1+1}+12=$	**3p**
	$=-9+12=3$, pentru orice număr real x	**2p**
b)	$0*x=3^{0+x}-3^{0+1}-3^{x+1}+12=3^x-3^{x+1}+9$, deci $3^{x+1}-3^x=18$	**3p**
	$3^x\left(3-1\right)=18\Leftrightarrow 3^x=9$, deci $x=2$	**2p**
c)	$x*y=3\Leftrightarrow 3^{x+y}-3^{x+1}-3^{y+1}+9=0\Leftrightarrow 3^x\left(3^y-3\right)-3\left(3^y-3\right)=0\Leftrightarrow \left(3^x-3\right)\left(3^y-3\right)=0$	**3p**
	$3^x-3=0$ sau $3^y-3=0$, deci $x=1$ sau $y=1$, de unde obţinem $\left(x-1\right)\left(y-1\right)=0$	**2p**

SUBIECTUL al III-lea **(30 de puncte)**

1.a)	$f'\left(x\right)=2x-\dfrac{2x}{x^2+1}=$	**3p**
	$=\dfrac{2x^3+2x-2x}{x^2+1}=\dfrac{2x^3}{x^2+1}$, $x\in\mathbb{R}$	**2p**
b)	Ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în $A\left(a,f\left(a\right)\right)$ este $y-f\left(a\right)=f'\left(a\right)\left(x-a\right)$, deci axa Ox, de ecuaţie $y=0$, este tangentă la graficul funcţiei f dacă şi numai dacă există numărul real a astfel încât $f'\left(a\right)=0$ şi $f\left(a\right)=0$	**3p**
	Cum $f'\left(0\right)=0$ şi $f\left(0\right)=0$, obţinem că axa Ox este tangentă graficului funcţiei f	**2p**
c)	$\lim\limits_{x\to-\infty}f\left(x\right)=+\infty$ şi $\lim\limits_{x\to+\infty}f\left(x\right)=+\infty$	**2p**
	f este continuă pe $\mathbb{R}$, $f'\left(x\right)<0$, pentru orice $x\in\left(-\infty,0\right)\Rightarrow f$ este strict descrescătoare pe $\left(-\infty,0\right)$, $f\left(0\right)=0$ şi $f'\left(x\right)>0$, pentru orice $x\in\left(0,+\infty\right)\Rightarrow f$ este strict crescătoare pe $\left(0,+\infty\right)$, deci, pentru orice număr natural nenul n, ecuaţia $f\left(x\right)=n$ are două soluţii reale distincte	**3p**
2.a)	$\int_1^e\dfrac{f\left(x\right)}{e^x}dx=\int_1^e\dfrac{1}{x}dx=\ln x\Big\vert_1^e=$	**3p**
	$=\ln e-\ln 1=1$	**2p**
b)	$\int_1^2x^3f\left(x^2\right)dx=\int_1^2xe^{x^2}dx=\dfrac{1}{2}e^{x^2}\Big\vert_1^2=$	**3p**
	$=\dfrac{e^4-e}{2}=\dfrac{e\left(e-1\right)\left(e^2+e+1\right)}{2}$	**2p**
c)	$\int_1^e\dfrac{e^x}{x}dx+\int_1^e e^x\ln x\,dx=\int_1^e\left(\ln x\right)'e^x\,dx+\int_1^e e^x\ln x\,dx=e^x\ln x\Big\vert_1^e-\int_1^e e^x\ln x\,dx+\int_1^e e^x\ln x\,dx=$	**3p**
	$=e^e\ln e-e^1\ln 1=e^e$	**2p**