Examenul de bacalaureat naţional 2020
Proba E. c)
Matematică *M_mate-info*

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Test 12

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

- **Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.**
- **Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.**
- **Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.**

SUBIECTUL I **(30 de puncte)**

1.	$N=5+2\cdot\sqrt{5}\cdot\sqrt{13}+13+5-2\cdot\sqrt{5}\cdot\sqrt{13}+13=$	**3p**
	$=36=6^2$	**2p**
2.	$f\left(f\left(1\right)\right)+f\left(1\right)=1\Leftrightarrow f\left(1\right)+a+1+a=1\Leftrightarrow 3a+2=1$	**3p**
	$a=-\frac{1}{3}$	**2p**
3.	$4^x+\frac{4}{4^x}=4\Leftrightarrow 4^{2x}-4\cdot 4^x+4=0\Leftrightarrow\left(4^x-2\right)^2=0$	**3p**
	$2^{2x}=2$, deci $x=\frac{1}{2}$	**2p**
4.	Cifra sutelor se poate alege în 2 moduri și pentru fiecare alegere a cifrei sutelor, cifra zecilor se poate alege în 2 moduri	**2p**
	Pentru fiecare alegere a cifrei sutelor și a cifrei zecilor, cifra unităților se poate alege într-un singur mod, deci se pot forma $2\cdot 2\cdot 1=4$ numere cu proprietatea cerută	**3p**
5.	$A\dot{B}+A\dot{C}=2A\dot{D}$, unde D este mijlocul segmentului BC	**2p**
	G este centrul de greutate al triunghiului ABC, deci $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$ și, cum $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AG}$, obținem $6A\dot{M}=A\dot{B}+A\dot{C}$	**3p**
6.	$\mathcal{A}_{\Delta ABC}=\frac{AB\cdot AC\cdot\sin A}{2}$, deci $\sin A=\frac{1}{2}$	**3p**
	Cum ΔABC este ascuțitunghic, obținem $m\left(\sphericalangle A\right)=30^\circ$	**2p**

SUBIECTUL al II-lea **(30 de puncte)**

1.a)	$A\left(0\right)=\begin{pmatrix}3&2&-1\\2&-2&1\\4&3&0\end{pmatrix}\Rightarrow\det\left(A\left(0\right)\right)=\begin{vmatrix}3&2&-1\\2&-2&1\\4&3&0\end{vmatrix}=$	**2p**
	$=0+\left(-6\right)+8-8-9-0=-15$	**3p**
b)	$\det\left(A\left(a\right)\right)=\begin{vmatrix}3&2&-1\\2&-2&1\\a+4&a+3&a\end{vmatrix}=-15\left(a+1\right)$, pentru orice număr real a	**2p**
	Rangul matricei $A\left(a\right)$ nu este egal cu $3\Leftrightarrow\det\left(A\left(a\right)\right)=0$, deci $a=-1$	**3p**
c)	$A\left(-1\right)A\left(-1\right)=\begin{pmatrix}3&2&-1\\2&-2&1\\3&2&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&2&-1\\2&-2&1\\3&2&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}10&0&0\\5&10&-5\\10&0&0\end{pmatrix}=5B$, unde $B=\begin{pmatrix}2&0&0\\1&2&-1\\2&0&0\end{pmatrix}$	**3p**
	$M=5^2B\cdot B$ și, cum matricea $B\cdot B$ are toate elementele numere întregi, obținem că matricea M are toate elementele numere întregi, divizibile cu 25	**2p**

2.a)	$x*(-x)=\sqrt[3]{x^3+(-x)^3+2020}=$	**3p**
	$=\sqrt[3]{x^3-x^3+2020}=\sqrt[3]{2020}$, pentru orice număr real x	**2p**
b)	$(x+1)*(-x)=\sqrt[3]{(x+1)^3-x^3+2020}=\sqrt[3]{3x^2+3x+2021}$, deci $3x^2+3x+2021=2021$	**3p**
	$3x(x+1)=0$, deci $x=-1$ sau $x=0$	**2p**
c)	$\sqrt[3]{3x^3+4040}=a \Leftrightarrow 3x^3+4040=a^3 \Leftrightarrow x^3=\dfrac{a^3-4040}{3}$	**3p**
	Pentru orice număr real a, ecuația $x^3=\dfrac{a^3-4040}{3}$ are o singură soluție reală $x=\sqrt[3]{\dfrac{a^3-4040}{3}}$, deci există un unic număr real x pentru care $x*x*x=a$	**2p**

SUBIECTUL al III-lea **(30 de puncte)**

1.a)	$f'(x)=3x^2-12x+9=$	**3p**
	$=3\left(x^2-4x+3\right)=3(x-1)(x-3)$, $x\in\mathbb{R}$	**2p**
b)	$f'(x)=0 \Leftrightarrow x=1$ sau $x=3$	**2p**
	$f'(x)\geq 0$, pentru orice $x\in(-\infty,1] \Rightarrow f$ este crescătoare pe $(-\infty,1]$, $f'(x)\leq 0$, pentru orice $x\in[1,3] \Rightarrow f$ este descrescătoare pe $[1,3]$ și $f'(x)\geq 0$, pentru orice $x\in[3,+\infty) \Rightarrow f$ este crescătoare pe $[3,+\infty)$	**3p**
c)	$f''(x)=6x-12$, $x\in\mathbb{R}$	**3p**
	Cum $f''(x)\leq 0$, pentru orice $x\in(-\infty,2]$, obținem că funcția f este concavă pe $(-\infty,2]$	**2p**
2.a)	$\int_0^1 f(x)\cdot\sqrt{x^2+3x+5}\,dx=\int_0^1(2x+3)dx=\left(x^2+3x\right)\Big\vert_0^1=$	**3p**
	$=1+3-0=4$	**2p**
b)	$\int_{-4}^1 f(x)dx=\int_{-4}^1\dfrac{2x+3}{\sqrt{x^2+3x+5}}dx=\int_{-4}^1\dfrac{\left(x^2+3x+5\right)'}{\sqrt{x^2+3x+5}}dx=2\sqrt{x^2+3x+5}\Big\vert_{-4}^1=$	**3p**
	$=2\sqrt{9}-2\sqrt{9}=0$	**2p**
c)	Dacă F este o primitivă a lui f, atunci $\left(F(\sin x)\right)'=F'(\sin x)\cdot(\sin x)'=f(\sin x)\cdot\cos x$, pentru orice număr real x	**3p**
	$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\, f(\sin x)dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(F(\sin x)\right)'dx=F(\sin x)\Big\vert_0^{\frac{\pi}{2}}=F(1)-F(0)=2\sqrt{1^2+3\cdot 1+5}-2\sqrt{5}=6-2\sqrt{5}$	**2p**