Examenul de bacalaureat naţional 2020
Proba E. c)
Matematică *M_mate-info*
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Test 14

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

- **Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.**
- **Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.**
- **Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.**

SUBIECTUL I **(30 de puncte)**

1.	$\log_3 5\cdot\log_5 9=\log_3 5\cdot\left(2\log_5 3\right)=2=$	**3p**
	$=\sqrt{2}^2$, deci numerele $\log_3 5$, $\sqrt{2}$ și $\log_5 9$ sunt termeni consecutivi ai unei progresii geometrice	**2p**
2.	$g(-x)=f(-x)-f\left(-(-x)\right)=f(-x)-f(x)=$	**2p**
	$=-\left(f(x)-f(-x)\right)=-g(x)$, deci funcția g este impară	**3p**
3.	$3^x+\dfrac{\sqrt{3}}{3^x}=1+\sqrt{3}\Leftrightarrow 3^{2x}-\left(1+\sqrt{3}\right)\cdot 3^x+\sqrt{3}=0$	**2p**
	$\left(3^x-1\right)\left(3^x-\sqrt{3}\right)=0$, de unde obținem $x=0$ sau $x=\dfrac{1}{2}$	**3p**
4.	$T_{k+1}=C_{20}^k\left(x^3\right)^{20-k}\left(\dfrac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^k=C_{20}^k x^{3(20-k)+\frac{-k}{3}}=C_{20}^k x^{60-\frac{10k}{3}}$, unde $k\in\{0,1,2,\ldots,20\}$	**3p**
	$60-\dfrac{10k}{3}=10\Leftrightarrow k=15$, deci $T_{16}=C_{20}^{15}x^{10}$ îl conține pe x^{10}	**2p**
5.	$3\dot{AG}=\dot{AG}+\dot{GB}+\dot{AG}+\dot{GC}\Leftrightarrow 3\dot{AG}=2\dot{AG}+\dot{GB}+\dot{GC}$	**2p**
	$\dot{AG}-\dot{GB}-\dot{GC}=\dot{0}\Leftrightarrow \dot{AG}+\dot{BG}+\dot{CG}=\dot{0}$, deci G este centrul de greutate al ΔABC	**3p**
6.	$\sin x\left(2\cos x-3\right)-\left(2\cos x-3\right)=0\Leftrightarrow\left(\sin x-1\right)\left(2\cos x-3\right)=0$	**2p**
	Cum $2\cos x-3\neq 0$ și $x\in(0,\pi)$, obținem $x=\dfrac{\pi}{2}$	**3p**

SUBIECTUL al II-lea **(30 de puncte)**

1.a)	$\det A=\begin{vmatrix}3&-1&-1\\-1&1&0\\-1&0&1\end{vmatrix}=3+0+0-1-0-1=$	**3p**
	$=3-2=1$	**2p**
b)	$\det\left(M(m)\right)=(m-1)^2$, pentru orice număr real m	**2p**
	Dacă $m=1$, matricea $M(1)=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}$ are rangul 1, iar dacă $m\neq 1$, atunci $\det\left(M(m)\right)\neq 0$ și matricea $M(m)$ are rangul 3, deci, pentru orice număr real m, rangul matricei $M(m)$ este diferit de 2	**3p**
c)	$M(m)\cdot A=I_3\Leftrightarrow\begin{pmatrix}1&0&0\\2-m&m-1&0\\2-m&0&m-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$	**3p**
	Obținem $m=2$, care convine	**2p**

2.a)	$(1+i)\circ(2-i)=1+i+2-i+(1+i)(2-i)=$	**3p**
	$=3+2-i+2i-i^2=6+i$	**2p**
b)	Dacă $z=a+ib$, unde a și b sunt numere reale, atunci $z\circ\overline{z}=a+ib+a-ib+(a+ib)(a-ib)=$	**3p**
	$=2a+a^2+b^2$, care este număr real, pentru orice număr complex z	**2p**
c)	$2z+z^2=-2\Leftrightarrow z^2+2z+2=0$	**2p**
	$\Delta=-4$, deci $z=-1-i$ sau $z=-1+i$	**3p**

SUBIECTUL al III-lea **(30 de puncte)**

1.a)	$f'(x)=\dfrac{x^2+x+1}{x^2-x+1}\cdot\dfrac{(2x-1)(x^2+x+1)-(2x+1)(x^2-x+1)}{(x^2+x+1)^2}=$	**3p**
	$=\dfrac{2x^2-2}{(x^2+x+1)(x^2-x+1)}=\dfrac{2(x-1)(x+1)}{(x^2+x+1)(x^2-x+1)}$, $x\in\mathbb{R}$	**2p**
b)	$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\ln\dfrac{x^2-x+1}{x^2+x+1}=\lim\limits_{x\to-\infty}\ln\dfrac{x^2\left(1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}\right)}{x^2\left(1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}\right)}=\lim\limits_{x\to-\infty}\ln\dfrac{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}=\ln1=0$	**3p**
	Dreapta de ecuație $y=0$ este asimptotă orizontală spre $-\infty$ la graficul funcţiei f	**2p**
c)	$f(1)+f(2)+\ldots+f(n)+2\ln n=\ln\dfrac{1}{3}+\ln\dfrac{3}{7}+\ln\dfrac{7}{13}+\ldots+\ln\dfrac{n^2-n+1}{n^2+n+1}+2\ln n=$	**3p**
	$=\ln\left(\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{3}{7}\cdot\dfrac{7}{13}\cdot\ldots\cdot\dfrac{n^2-n+1}{n^2+n+1}\right)+\ln\left(n^2\right)=\ln\dfrac{1}{n^2+n+1}+\ln\left(n^2\right)=\ln\dfrac{n^2}{n^2+n+1}$, pentru orice număr natural nenul n	
	$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(f(1)+f(2)+\ldots+f(n)+2\ln n\right)=\lim\limits_{n\to+\infty}\ln\dfrac{n^2}{n^2+n+1}=\ln1=0$	**2p**
2.a)	$\int_0^1 e^x f(x)\,dx=\int_0^1\left(x^2+1\right)dx=\left(\dfrac{x^3}{3}+x\right)\Big\vert_0^1=$	**3p**
	$=\dfrac{1}{3}+1-0=\dfrac{4}{3}$	**2p**
b)	$\int_0^1 f(-x)\,dx=\int_0^1\left(x^2+1\right)e^x dx=\left(x^2+1\right)e^x\Big\vert_0^1-\int_0^1 2xe^x dx=2e-1-2(x-1)e^x\Big\vert_0^1=$	**3p**
	$=2e-1-0+(-2)=2e-3$	**2p**
c)	F este primitivă a lui $f\Rightarrow F'(x)=f(x)\Rightarrow -e^{-x}\left(-x^2+ax+b\right)+e^{-x}(-2x+a)=e^{-x}\left(x^2+1\right)$, pentru orice număr real x	**2p**
	$x^2-(a+2)x+a-b=x^2+1$, pentru orice număr real $x\Leftrightarrow a=-2$ și $b=-3$	**3p**