**Examenul de bacalaureat naţional 2020**
**Proba E. c)**

**Matematică *M_şt-nat***
**BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE**

**Test 17**

***Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii***

- **Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.**
- **Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.**
- **Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.**

**SUBIECTUL I** **(30 de puncte)**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | $a_5 = a_1 + 4r = 1 - 3\sqrt{3} + 4\sqrt{3} = 1 + \sqrt{3}$ | **2p** |
| | Cum $1 < \sqrt{3} < 2 \Rightarrow 2 < 1 + \sqrt{3} < 3$, obţinem că $\{a_5\} = a_5 - [a_5] = 1 + \sqrt{3} - 2 = \sqrt{3} - 1$ | **3p** |
| **2.** | $f(-2) = f(2) = \sqrt{5}$, $f(-1) = f(1) = \sqrt{2}$, $f(0) = 1$ | **3p** |
| | $f(-2) \cdot f(-1) \cdot f(0) \cdot f(1) \cdot f(2) = \sqrt{5}^2 \cdot \sqrt{2}^2 \cdot 1 = 10 \in \mathbb{N}$ | **2p** |
| **3.** | $\log_3(5x-1) = \log_3(x+1)^2 \Rightarrow 5x - 1 = x^2 + 2x + 1 \Rightarrow x^2 - 3x + 2 = 0$ | **3p** |
| | $x = 1$ sau $x = 2$, care convin | **2p** |
| **4.** | $\{1,2,3\} \subset X \Rightarrow 1,2,3 \in X$ | **2p** |
| | $X \subset \{1,2,3,4,5\} \Rightarrow X = \{1,2,3\}$, $X = \{1,2,3,4\}$, $X = \{1,2,3,5\}$ sau $X = \{1,2,3,4,5\}$, deci există 4 mulţimi $X$ astfel încât $\{1,2,3\} \subset X \subset \{1,2,3,4,5\}$ | **3p** |
| **5.** | $2\vec{u} + 3\vec{v} = 2(a\vec{i} + 3\vec{j}) + 3(2\vec{i} + b\vec{j}) = (2a+6)\vec{i} + (6+3b)\vec{j}$ | **2p** |
| | $(2a+6)\vec{i} + (6+3b)\vec{j} = \vec{0}$, deci $a = -3$ şi $b = -2$ | **3p** |
| **6.** | $\Delta ABC$ este dreptunghic isoscel, cu ipotenuza $BC = 8\sqrt{2}$, deci $AB = AC = 8$ | **2p** |
| | $r = \frac{S}{p} = \frac{32}{4(2+\sqrt{2})} = 4(2-\sqrt{2})$ | **3p** |

**SUBIECTUL al II-lea** **(30 de puncte)**

| | | |
|---|---|---|
| **1.a)** | $\det(A(a)) = \begin{vmatrix} 1 & a \\ a^2 & a^3 \end{vmatrix} = 1 \cdot a^3 - a \cdot a^2 =$ | **3p** |
| | $= a^3 - a^3 = 0$, pentru orice număr real $a$ | **2p** |
| **b)** | $A(2) + xI_2 = \begin{pmatrix} 1+x & 2 \\ 4 & 8+x \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A(2) + xI_2) = x^2 + 9x$, deci $x^2 + 9x = 0$ | **3p** |
| | $x = -9$ sau $x = 0$ | **2p** |
| **c)** | $A(a) \cdot A(b) = \begin{pmatrix} 1 & a \\ a^2 & a^3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & b \\ b^2 & b^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+ab^2 & b+ab^3 \\ a^2+a^3b^2 & a^2b+a^3b^3 \end{pmatrix}$, $A(b) \cdot A(a) = \begin{pmatrix} 1+ba^2 & a+ba^3 \\ b^2+b^3a^2 & b^2a+b^3a^3 \end{pmatrix}$, pentru orice numere reale $a$ şi $b$ | **3p** |
| | $\begin{pmatrix} 1+ab^2 & b+ab^3 \\ a^2+a^3b^2 & a^2b+a^3b^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+ba^2 & a+ba^3 \\ b^2+b^3a^2 & b^2a+b^3a^3 \end{pmatrix}$, de unde obţinem $a = b$ | **2p** |
| **2.a)** | $0 * 8 = \sqrt[3]{0^2 + 8^2} =$ | **3p** |
| | $= \sqrt[3]{64} = 4$ | **2p** |

| | | |
|---|---|---|
| **b)** | Dacă $e$ este elementul neutru al legii de compoziție „$*$”, atunci $e*x=x$, pentru orice număr real $x$, deci $e*0=0\Rightarrow\sqrt[3]{e^2}=0$ și obținem $e=0$ | **3p** |
| | Cum $0*8=4\neq 8$, $e=0$ nu este element neutru al legii de compoziție „$*$”, deci legea de compoziție „$*$” nu are element neutru | **2p** |
| **c)** | De exemplu, pentru $m=2k^3$ și $n=2k^3$, unde $k\in\mathbb{N}^*\Rightarrow m*n=\sqrt[3]{m^2+n^2}=\sqrt[3]{\left(2k^3\right)^2+\left(2k^3\right)^2}=$ | **3p** |
| | $=\sqrt[3]{8k^6}=2k^2\in\mathbb{N}^*$, deci există o infinitate de perechi $(m,n)$ de numere naturale nenule pentru care numărul $m*n$ este natural nenul | **2p** |

**SUBIECTUL al III-lea** **(30 de puncte)**

| | | |
|---|---|---|
| **1.a)** | $f'(x)=x'-\left(\sqrt{x+1}\right)'=$ | **2p** |
| | $=1-\dfrac{1}{2\sqrt{x+1}}=\dfrac{2\sqrt{x+1}-1}{2\sqrt{x+1}}$, $x\in(-1,+\infty)$ | **3p** |
| **b)** | $f'(x)=0\Leftrightarrow 2\sqrt{x+1}=1\Leftrightarrow x+1=\dfrac{1}{4}\Leftrightarrow x=-\dfrac{3}{4}$ | **2p** |
| | Pentru $x\in\left(-1,-\dfrac{3}{4}\right]$, $f'(x)\leq 0$, deci $f$ este descrescătoare pe $\left(-1,-\dfrac{3}{4}\right]$ și, pentru $x\in\left[-\dfrac{3}{4},+\infty\right)$ $f'(x)\geq 0$, deci $f$ este crescătoare pe $\left[-\dfrac{3}{4},+\infty\right)$ | **3p** |
| **c)** | $\ln x\geq 1$, pentru orice $x\in[e,+\infty)$ și $f$ este crescătoare pe $[1,+\infty)$ | **2p** |
| | $f(\ln x)\geq f(1)\Rightarrow \ln x-\sqrt{\ln x+1}\geq 1-\sqrt{2}\Rightarrow \ln x\geq\sqrt{\ln x+1}+1-\sqrt{2}$, pentru orice $x\in[e,+\infty)$ | **3p** |
| **2.a)** | $\displaystyle\int_0^1\frac{f(x)}{e^x}\,dx=\int_0^1\frac{e^x\left(x^2-4x+5\right)}{e^x}\,dx=\int_0^1\left(x^2-4x+5\right)dx=\left(\frac{x^3}{3}-\frac{4x^2}{2}+5x\right)\Big\vert_0^1=$ | **3p** |
| | $=\dfrac{1}{3}-2+5=\dfrac{10}{3}$ | **2p** |
| **b)** | $F'(x)=f(x)$ și $F''(x)=e^x\left(x^2-4x+5\right)+e^x(2x-4)=e^x\left(x^2-2x+1\right)=e^x(x-1)^2$, $x\in\mathbb{R}$ | **3p** |
| | $e^x(x-1)^2\geq 0$, pentru orice număr real $x$, deci, pentru orice primitivă $F$ a lui $f$, obținem $F''(x)\geq 0$, pentru orice număr real $x$, deci $F$ este convexă | **2p** |
| **c)** | $F'(x)=e^x\left(ax^2+bx+c\right)+e^x(2ax+b)=e^x\left(ax^2+(b+2a)x+c+b\right)$, pentru orice $x\in\mathbb{R}$ | **3p** |
| | $ax^2+(b+2a)x+c+b=x^2-4x+5$, pentru orice $x\in\mathbb{R}$, de unde obținem $a=1$, $b=-6$ și $c=11$ | **2p** |