Examenul de bacalaureat naţional 2020
Proba E. c)
Matematică *M_tehnologic*
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Test 4

Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale

- **Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.**
- **Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.**
- **Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.**

SUBIECTUL I **(30 de puncte)**

1.	$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{6+3+2+1}{6}=\frac{12}{6}=2$	**3p**
	$\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right)^2-\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right)=2^2-2=2$	**2p**
2.	$x_1+x_2=4$, $x_1x_2=m\Rightarrow x_1^2+x_2^2=16-2m$	**3p**
	$16-2m=2\Leftrightarrow m=7$	**2p**
3.	$3x+1=(3x+1)^2\Rightarrow 3x(3x+1)=0$	**2p**
	$x=-\frac{1}{3}$ sau $x=0$, care convin	**3p**
4.	$x-\frac{25}{100}\cdot x=750$, unde x este preţul obiectului înainte de ieftinire	**3p**
	$x=1000$ de lei	**2p**
5.	$OABC$ este paralelogram, deci segmentele OB şi AC au acelaşi mijloc	**2p**
	Punctul $M(4,3)$ este mijlocul segmentului OB, deci $x_C=8$ şi $y_C=4$	**3p**
6.	$\cos 30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$, $\cos 90^\circ=0$	**3p**
	$\sqrt{3}\cos 30^\circ+\sin 30^\circ+\frac{1}{2}\cos 90^\circ=\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cdot 0=\frac{3}{2}+\frac{1}{2}=2$	**2p**

SUBIECTUL al II-lea **(30 de puncte)**

1.a)	$M(1)=I_2+A=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&1\\2&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\2&1\end{pmatrix}\Rightarrow \det(M(1))=\begin{vmatrix}1&1\\2&1\end{vmatrix}=$	**3p**
	$=1-2=-1$	**2p**
b)	$M(a)\cdot M(b)-M(a+b)=(I_2+aA)(I_2+bA)-(I_2+(a+b)A)=abA\cdot A$, pentru orice numere reale a şi b	**3p**
	Cum $A\cdot A=\begin{pmatrix}2&0\\0&2\end{pmatrix}=2I_2$ şi $M(0)=I_2$, obţinem $M(a)\cdot M(b)-M(a+b)=2abM(0)$, pentru orice numere reale a şi b	**2p**
c)	$\det M(1)\neq 0$, $(M(1))^{-1}=\begin{pmatrix}-1&1\\2&-1\end{pmatrix}$	**3p**
	$X=M(0)\cdot(M(1))^{-1}\Rightarrow X=\begin{pmatrix}-1&1\\2&-1\end{pmatrix}$	**2p**
2.a)	$1*(-1)=4\cdot 1\cdot(-1)+4\cdot 1+4\cdot(-1)+3=$	**3p**
	$=-4+4-4+3=-1$	**2p**

b)	$x*y=4xy+4x+4y+4-1=$ $=4x(y+1)+4(y+1)-1=4(x+1)(y+1)-1$, pentru orice numere reale x și y	**2p** **3p**
c)	$x*\frac{1}{4}=5x+4$, $(5x+4)*(-x)=20(1-x^2)-1$, pentru orice număr real x $20(1-x^2)=20$, de unde obținem $x=0$	**3p** **2p**

SUBIECTUL al III-lea **(30 de puncte)**

1.a)	$f'(x)=\frac{(2x+4)(x+1)-(x^2+4x+4)}{(x+1)^2}=$ $=\frac{x^2+2x}{(x+1)^2}=\frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$, $x\in(-1,+\infty)$	**3p** **2p**
b)	$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^2+4x+4}{x(x+1)}=1$ $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{3x+4}{x+1}=3$, deci dreapta de ecuație $y=x+3$ este asimptotă oblică spre $+\infty$ la graficul funcției f	**2p** **3p**
c)	$f''(x)=\frac{2}{(x+1)^3}$, $x\in(-1,+\infty)$ $f''(x)>0$, pentru orice $x\in(-1,+\infty)$, deci funcția f este convexă	**2p** **3p**
2.a)	$\int_0^1(x^2+1)(f(x)-x^2)dx=\int_0^1(x^2+1)\cdot\frac{1}{x^2+1}dx=\int_0^1 dx=$ $=x\Big\vert_0^1=1-0=1$	**2p** **3p**
b)	$\int_{-1}^1 xf(x)dx=\int_{-1}^1\left(x^3+\frac{x}{x^2+1}\right)dx=\left(\frac{x^4}{4}+\frac{1}{2}\ln(x^2+1)\right)\Big\vert_{-1}^1=$ $=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\ln 2=0$	**3p** **2p**
c)	$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1\left(x^2+\frac{1}{x^2+1}\right)dx=\left(\frac{x^3}{3}+\text{arctg}x\right)\Big\vert_0^1=\frac{1}{3}+\frac{\pi}{4}$ $\frac{n^2}{3}+\frac{\pi}{4}-1=\frac{1}{3}+\frac{\pi}{4}\Leftrightarrow n^2=4$ și, cum n este număr natural, obținem $n=2$	**3p** **2p**