Examenul de bacalaureat naţional 2020
Proba E. c)

Matematică *M_mate-info*
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Test 8

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

- **Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.**
- **Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.**
- **Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.**

SUBIECTUL I **(30 de puncte)**

1.	$A=\{0,1,2\}$	**3p**
	Suma elementelor mulțimii A este egală cu $0+1+2=3$	**2p**
2.	$f(1)=m+n$ și $f(2)=2m+n$, deci $m+n=2$ și $2m+n=1$	**2p**
	$m=-1$, $n=3$	**3p**
3.	$\left(4^x+4\right)\left(4^x-2\right)=0$	**2p**
	$2^{2x}=2$, deci $x=\frac{1}{2}$	**3p**
4.	Mulțimea numerelor naturale de trei cifre are 900 de elemente, deci sunt 900 de cazuri posibile	**2p**
	Mulțimea numerelor naturale de trei cifre care au cifra sutelor un număr prim are $4\cdot10\cdot10=400$ de elemente, deci sunt 400 de cazuri favorabile	**2p**
	$p=\frac{\text{nr. cazuri favorabile}}{\text{nr. cazuri posibile}}=\frac{400}{900}=\frac{4}{9}$	**1p**
5.	O este punctul de intersecție a diagonalelor paralelogramului $ABCD\Rightarrow \dot{OC}=-\dot{OA}$	**3p**
	$\dot{OB}+\dot{OC}=\dot{OB}-\dot{OA}=\dot{AB}$	**2p**
6.	$\sin^2 x=1-\cos^2 x=1-\frac{16}{25}=\frac{9}{25}$	**3p**
	Cum $x\in\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$, obținem $\sin x=-\frac{3}{5}$	**2p**

SUBIECTUL al II-lea **(30 de puncte)**

1.a)	$A(0)=\begin{pmatrix}2&0&1\\-3&0&1\\3&-1&1\end{pmatrix}\Rightarrow \det\left(A(0)\right)=\begin{vmatrix}2&0&1\\-3&0&1\\3&-1&1\end{vmatrix}=$	**3p**
	$=0+3+0-0-(-2)+0=5$	**2p**
b)	$\det\left(A(a)\right)=a^2-6a+5$, pentru orice număr real a	**2p**
	Sistemul de ecuații este compatibil determinat $\Leftrightarrow \det\left(A(a)\right)\neq 0$, deci $a\in\mathbb{R}\setminus\{1,5\}$	**3p**
c)	Sistemul are soluție unică (x_0,y_0,z_0), deci $a\in\mathbb{R}\setminus\{1,5\}$ și soluția sistemului este $\left(\frac{2(a-1)}{a-5},-\frac{2}{a-5},-\frac{a+1}{a-5}\right)$	**3p**
	$2\cdot\left(-\frac{2}{a-5}\right)=\frac{2(a-1)}{a-5}+\left(-\frac{a+1}{a-5}\right)$, deci $a=-1$, care convine	**2p**

2.a)	$1*3=1+3-\frac{1\cdot 3}{3}=$	**3p**
	$=1+3-1=3$	**2p**
b)	$x*x=-\frac{1}{3}(x-3)^2+3$, $x*x*x=\frac{1}{3^2}(x-3)^3+3$, pentru orice număr real x	**2p**
	$\frac{1}{9}(x-3)^3+3=\frac{26}{9}\Leftrightarrow(x-3)^3=-1\Leftrightarrow x-3=-1$, de unde obţinem $x=2$	**3p**
c)	$x*0=0*x=x$, pentru orice număr real x, deci $e=0$ este elementul neutru al legii de compoziţie „$*$”	**1p**
	$n*n'=0\Leftrightarrow n'(n-3)=3n$, deci $n'=\frac{3n}{n-3}$, pentru orice număr natural n, $n\neq 3$	**2p**
	Cum n şi n' sunt numere naturale, obţinem $n=0$, $n=4$, $n=6$ sau $n=12$	**2p**

SUBIECTUL al III-lea **(30 de puncte)**

1.a)	$f'(x)=4x^3-\frac{4}{x}=$	**3p**
	$=\frac{4(x^4-1)}{x}=\frac{4(x^2-1)(x^2+1)}{x}=\frac{4(x-1)(x+1)(x^2+1)}{x}$, $x\in(0,+\infty)$	**2p**
b)	$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}(x^4-4\ln x)=+\infty$	**3p**
	Dreapta de ecuaţie $x=0$ este asimptotă verticală la graficul funcţiei f	**2p**
c)	$f'(x)=0\Leftrightarrow x=1$, $f'(x)<0$, pentru orice $x\in(0,1)\Rightarrow f$ este strict descrescătoare pe $(0,1)$ şi $f'(x)>0$, pentru orice $x\in(1,+\infty)\Rightarrow f$ este strict crescătoare pe $(1,+\infty)$	**2p**
	$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=+\infty$, $f(1)=1$, $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ şi f este continuă pe $(0,+\infty)$, deci pentru fiecare număr natural n, $n\geq 2$, ecuaţia $f(x)-n=0$ are două soluţii reale distincte, $x_1\in(0,1)$ şi $x_2\in(1,+\infty)$	**3p**
2.a)	$\int_0^2 f(x)e^{-x}dx=\int_0^2 x^3dx=\frac{x^4}{4}\Big\vert_0^2=$	**3p**
	$=4-0=4$	**2p**
b)	$\int_1^e \frac{1}{x^2}f(\ln x)dx=\int_1^e \frac{1}{x}\ln^3 x dx=\frac{\ln^4 x}{4}\Big\vert_1^e=$	**3p**
	$=\frac{\ln^4 e}{4}-\frac{\ln^4 1}{4}=\frac{1}{4}$	**2p**
c)	$F(x)=(x^3-3x^2+6x-6)e^x+c$, $c\in\mathbb{R}$ şi, cum $F(0)=0\Rightarrow F(x)=(x^3-3x^2+6x-6)e^x+6$	**2p**
	$\int_0^1 f(x)F(x)dx=\int_0^1 F'(x)F(x)dx=\frac{1}{2}F^2(x)\Big\vert_0^1=\frac{1}{2}(F^2(1)-F^2(0))=2(e-3)^2$	**3p**